


ZIKA VIRUS

VIRUS PRÄVENTION UND SYMPTOME




ZIKA VIRUS

Familie: Flaviviridae
Genus: Flavivirus



Der Virus wird durch Moskitostiche verbreitet:



Einer von fünf infizierten Menschen wird krank.

Der Virus kann durch Blut oder sexuell übertragen werden.

Eine schwangere Frau kann den Virus auf ihr Baby übertragen, was zu Mikrozephalie führen kann.

PRÄVENTION



LANGÄRMELIGE SHIRTS,
LANGE HOSEN UND
HÜTE TRAGEN



EFFEKTIVEN INSEKTEN-
SCHUTZ BENUTZEN



UNTER EINEM MOSKI-
TONETZ SCHLAFEN



WASSERBEHÄLTER
LEEREN/REINIGEN




FENSTER UND TÜREN
MIT MOSKINETZEN
SCHÜTZEN



AUCH KLEIDUNG MIT
INSEKTENSCHÜTZ-
MITTEL EINSRÜHEN

**SCHÜTZEN SIE SICH
VOR MÜCKENSTICHEN**

SYMPTOME



BEHANDLUNG



EINEN ARZT
KONSULTIEREN



VIEL WASSER
TRINKEN



MEDIKAMENTE GEGEN
SCHMERZEN UND
FIEBER NEHMEN



RUHE



Die Inkubationszeit beträgt
normalerweise zwischen 2
und 7 Tagen.



Es gibt keinen Impfstoff oder
Behandlungen durch antivirale
Medikamente.



Bei Reisen in Risikogebiete
sollten Vorsichtsmaßnahmen
gegen Mückenstiche getroffen
werden.